Prospect KEBENE ANTIACID: 150x210 mm

K SHTANTZA

KEBENE® antiacid

1,2 g
cu gust de vanilie

Instrucțiuni de utilizare

Acțiune triplă:
Tratamentul simptomatic al durerilor de stomac și arsurilor în capul pieptului
Reduce refluxul gastroesofagian
Efect anti-balonare

Comprimate masticabile
Gust de vanilie
Fără lactoză
Fără gluten

INGREDIENTE
Carbonat de calciu, hidroxid de magneziu, simeticonă, sorbitol, citrat de sodiu, stearat de magneziu, aromă, hidroxipropilceluloză, maltodextrină, dioxid de siliciu, sucraloză.

Acest produs conține o cantitate de 855 mg de carbonat de calciu, 120 mg de hidroxid de magneziu, 120 mg de citrat de sodiu și 60 mg de simeticonă pentru o singură doză administrată (egală cu 2 comprimate a câte 1,2 grame)

INDICAȚII
KEBENE ANTIACID este indicat pentru tratamentul arsurilor și durerilor gastrice cauzate de aciditatea în exces (reduce hiperaciditatea gastrică). Produsul este, de asemenea, util în tratarea simptomelor asociate refluxului gastroesofagian și dispepsiei (precum dificultăți de digestie, arsuri gastrice, durere și senzație de arsură în zona pieptului, senzația de plenitudine imediat după masă).

CUM ACȚIONEAZĂ
KEBENE ANTIACID este un dispozitiv medical sub formă de comprimate masticabile, conținând o combinație de carbonat de calciu, hidroxid de magneziu, citrat de sodiu și simeticonă. Odată ajuns în interiorul stomacului, produsul neutralizează pH-ul sucurilor gastrice și al vaporilor acizi, exercitând o acțiune protectoare și calmantă asupra mucoasei gastroesofagiene, cu o acțiune rapidă împotriva durerii epigastrice cauzate de hiperaciditate. Simeticona este o substanță care reduce tensiunea de suprafață a bulelor de gaz din tractul gastrointestinal, facilitând eliminarea acestora, reducând senzația de balonare și distensia abdominală.

CUM SE ADMINISTREAZĂ ȘI POSOLOGIE
Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: Se recomandă să luați 2 comprimate la nevoie (în cazul în care manifestați simptome de arsură și/sau durere), administrate după mesele principale și seara înainte de culcare. A se mesteca bine înainte de înghițire. A nu se depăși doza maximă de 8 comprimate pe zi.

AVERTISMENTE
Acest produs conține o cantitate de sodiu egală cu aproximativ 28 mg, una de calciu egală cu aproximativ 333 mg și una de magneziu egală cu aproximativ 53 mg pentru o singură doză administrată (egală cu 2 comprimate a câte 1,2 grame).
Produsul nu este destinat utilizării la copiii cu vârsta sub 12 ani.
În cazul hipersensibilității la una sau mai multe componente, evitați utilizarea produsului.
Dacă apar reacții adverse nedorite, întrerupeți tratamentul și solicitați sfatul medicului.
Produsul poate interfera cu absorbția medicamentelor administrate pe cale orală. Solicitați sfatul medicului în cazul în care luați medicamente administrate pe cale orală, care, în orice caz, trebuie administrate la o distanță de timp de cel puțin 2 ore.
Nu utilizați produsul pentru o perioadă mai lungă de 2 săptămâni. La nevoie, solicitați sfatul medicului.
A nu se utiliza în caz de patologii sau disfuncții care afectează sistemul renal.
Vă rugăm să solicitați sfatul medicului în caz de hipercalcemie (concentrații crescute de calciu în sânge), hipermagneziemie (concentrații crescute de magneziu în sânge), nefrocalcinoză și calculi renali recurenți care conțin calciu.
Nu există contraindicații privind utilizarea în timpul sarcinii și alăptării, însă se recomandă în acest caz să solicitați sfatul medicului înainte de utilizare. A nu se utiliza dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau dacă se observă modificări vizibile ale aspectului comprimatelor.
Nu utilizați produsul după data de expirare tipărită pe ambalaj.

Prospect KEBENE ANTIACID: 150x210 mm

K SHTANTZA

REACȚII ADVERSE
După ce administrați produsul, pot să apară reacții adverse ușoare și tranzitorii, cum ar fi: balonare, durere abdominală, eructații, flatulență, constipație. Utilizarea produsului în conformitate cu instrucțiunile reduce riscul de reacții adverse nedorite.

CUM SE PĂSTREAZĂ
A nu se păstra la îndemâna și vederea copiilor. Produsul trebuie păstrat la o temperatură cuprinsă între 8 °C și 25 °C, într-un loc răcoros și uscat și departe de surse de căldură. Data de expirare se referă la produsul în ambalaj intact și păstrat în condiții corespunzătoare. Nu păstrați bucăți de comprimat pentru utilizare ulterioară.

AMBALAJ
KEBENE ANTIACID se prezintă sub formă de blistere care conțin 40 de comprimate masticabile a câte 1,2 g fiecare.

Biofarma – Via Castelliere 2 – Mereto di Tomba (UD) – Italia

Distribuit de: Terapia SA
Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca, Romania

Dispozitiv medical CE 0373

Data ultimei revizuiri: August 2023

(IFU1_08/23r0_08/23)